

POSTINOR²

Šta treba uraditi pre upotrebe Postinora-2?

Pre nego što uzmete Postinor-2 treba isključiti postojanje trudnoće. Uradite test trudnoće ili se konsultujete sa Vašim ginekologom. Ne treba da uzmete Postinor-2 ako Vaš ciklus kasni, ako je neuobičajen ili ako imate vaginalno krvarenje nepoznatog porekla.

Da li je bitno kada se unutar 72h uzima prva tableta Postinora-2?

Bitno je. Što pre uzmete prvu tabletu Postinora-2 nakon seksualnog odnosa manje su šanse da ostanete u drugom stanju. Najbolji kontraceptivni efekat zabeležen je u onim slučajevima, kada je prva tableta korišćena unutar 24h.

Koliko često se može koristiti Postinor-2?

Onoliko često koliko je potrebno, kada je neka druga kontraceptivna metoda bila neuspešna! Tablete za urgentnu kontracepciju su sigurne i efikasne čak i kada se koriste više od jednom u toku istog ciklusa, praktično ne postoje ograničenja, ipak treba naglasiti, Postinor-2 nije klasični kontraceptiv i ovu metodu kontracepcije ne treba zloupotrebljavati i koristiti kao redovnu kontracepciju, nego zaista samo u specijalnim i hitnim slučajevima. Ukoliko ste seksualno aktivni konsultujte se sa ginekologom, on će Vam pomoći u odabiru najboljeg kontraceptivnog sredstva za Vas.

Šta uraditi ako ste zaboravili uzeti drugu tabletu?

Što pre popijte drugu tabletu i odmah se obratite Vašem ginekologu.

Šta ako dođe do povraćanja nakon primene Postinora-2?

Ako do povraćanja dođe unutar prva 3h nakon uzimanja prve tablete neophodno je ponovno uzimanje prve doze, a dalje postupiti po uputstvu za upotrebu leka. Ako do povraćanja dođe nakon druge tablete, a da pri tome nakon prve nije bilo problema, treba se konsultovati sa ginekologom, jer je u takvim situacijama može doći do umanjenog kontraceptivnog efekta preparata.

Preporuka: Postinor-2 je najbolje uzeti u toku jela sa malom količinom vode i poželjna je i upotreba antiemetika (lekova protiv povraćanja).

Šta treba uraditi nakon korišćenja Postinora-2?

Nakon primene Postinora-2 pri završetku prve naredne menstruacije, odnosno ako krvarenje kasni duže od 10 dana, preporučuje se pregled ginekologa kako bi se proverila efikasnost primenjenog metoda, odnosno isključila trudnoća.

Postinor-2 štiti samo od polnog odnosa koji se desio u poslednjih 72h i ne pruža zaštitu od neželjene trudnoće unapred, stoga je neophodno sve polne odnose koji slede, do pojave prvog menstrualnog krvarenja zaštititi primenom mehaničke kontracepcije.

Šta ako ste nakon korišćenja Postinora-2 ipak ostali u drugom stanju?

Ako upotreba Postinora-2 ne spreči nastajanje trudnoće, a žena želi da zadrži novonastalu trudnoću, ona to može učiniti bez straha. Rađeno je više studija i sve one potvrđuju da Postinor-2 nema teratogeni efekat (ne oštećuje plod), jer se uzima u fazi u kojoj ne postoji placentarna cirkulacija, odnosno veza između majke i bebe.

Da li je primena Postinora-2 kontraindikovana kod dojilja?

Nije. Važno je napomenuti da iako se Postinor-2, tačnije levonorgestrel izdvaja u mleku 0,1%, laktacija nije kontraindikacija za primenu preparata. Potencijalna izloženost deteta levonorgestrelom može se svesti na minimum, ako dojilja tablete u oba slučaja uzme neposredno nakon dojenja i nakon uzimanja leka ne doji.

Gde možete nabaviti Postinor-2?

Postinor-2 se može nabaviti u svim bolje snabdevenim apotekama. Budite slobodni i pitajte Vaše farmaceute za sve pojedinosti koje Vam nisu jasne u vezi Postinora-2.

Sva svoja pitanja u vezi Postinora-2, radi razjašnjavanja eventualnih nedoumica možete postaviti na sledeći e-mail: postinor@goodwillpharma.com Na Vaša pitanja odgovoriće lekari specijalisti ginekologije i akušerstva.